

CALCIRETARD®

SUPLEMENTO ALIMENTAR

Apresentação

Embalagem de 100 comprimidos gastrorresistentes



Ingredientes	Por	% VRN*	TDR	% VRN*	TDR	% VRN*
	1 comp.		(3 comp.)		(9 comp.)	
DL-hidrogenoaspartato bicálcio	175 mg	2,88%	525 mg	8,63%	1575 mg	25,88%
L-hidrogenoaspartato bicálcio	175 mg	2,88%	525 mg	8,63%	1575 mg	25,88%

Revestimento: Estearato de Magnésio, Talco, Dióxido de Titânio, Agregante.

*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (UE) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2011

Indicações

Todas as formas de deficiência em Cálcio, especialmente a Osteoporose, hipocalcemia e tetania. Osteopénia e casos de jovens com insuficiente crescimento ósseo. Pessoas cuja alimentação seja deficiente em laticínios (alimentos ricos em Cálcio). Algumas formas alérgicas, quando associadas a uma diminuição de Cálcio.

Toma diária recomendada (TDR)

Adultos: 3 comprimidos, 1 a 3 vezes por dia, com bastante água.

Características

O Calciretard® garante uma melhor biodisponibilidade, graças à sua formulação à base de Aspartato (Ácido Aspártico) e permite uma melhor absorção do Cálcio, apresentando um melhor efeito terapêutico devido à sua ação "retard".

Este tipo de formulação comparativamente com as formulações à base de Cálcio inorgânico, apresenta uma forma mais lenta de libertação do mineral, não o libertando facilmente na corrente sanguínea, eliminando a possibilidade do aumento da taxa de Cálcio livre no sangue e conseqüente depósito de Cálcio ao nível dos rins e tecidos moles. O revestimento gastroresistente das drageias permite minimizar os problemas gástricos.

A grande vantagem da utilização do Aspartato como transportador do Cálcio, é a garantia da entrada do Cálcio no interior das células, e o conseqüente aproveitamento do Ácido Aspártico que é libertado e aproveitado no circuito da respiração celular.

Contra-indicações

Pacientes que realizem terapêutica com digitálicos, alterações severas do sistema eurofisiológico, hipercalcémia e hipercalcúria.

Recomendações

Não deve ser excedida a toma diária indicada.

Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação.

Os suplementos alimentares não são substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado nem de um modo de vida saudável.

Conservar na embalagem original protegida da luz, em local seco e a temperatura inferior a 25°C.

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

O uso seguro durante a gravidez e amamentação deve ser realizado sob supervisão médica.