

FORTAKEHL® D5 Comprimidos

AIM n.º 0617483

Apresentação

Embalagem de 20 comprimidos

Composição/Comprimido:

250 mg de *Penicillium roquefortii* e *volumine cellulae* (*yophil, steril.*) D5 trit.

Excipiente(s): Amido de batata, estearato de magnésio.



Características

Fortakehl é obtido a partir da levedura do fungo *Penicillium roquefortii*, não é um antibiótico e não produz substâncias antibióticas. Portanto, não há ocorrência de efeitos secundários que podem aparecer durante um tratamento antibiótico, tais como alergias, deficiências hepáticas, destruição da flora intestinal, e da formação de cadeias resistentes à penicilina. Fortakehl é dado no início de todos os tratamentos de simbiose para a recuperação intestinal e, consecutivamente, para todas as outras micoses, tais como micoses vaginais, da pele e da boca. De acordo com Enderlein, o sangue de todos os seres humanos e mamíferos contém um endobionte de origem vegetal. A sua forma mais primitiva é a fase coloidal apatogénica, caracterizada por pequeníssimas partículas proteicas do tamanho de um vírus (0,01 µm). Um ciclo de desenvolvimento das formas primitivas, através da fase de bactéria, até à fase fúngica, é iniciada por factores endógenos ou exógenos, e a virulência do parasita aumenta com o crescente desenvolvimento da fase. Não existe ser humano que não tenha adquirido este endobionte através da placenta e que não seja hospedeiro das formas mais primitivas, nas suas células e fluidos corporais. Num corpo saudável, estas formas primitivas servem como reguladores, pois são capazes de copular ciclo geneticamente com formas parasitárias mais evoluídas, e reverte-las à sua forma primitiva. O corpo deve, em seguida, eliminar estes resíduos do seu corpo. Quando não é possível uma completa eliminação, através da pele, intestinos, rins e brônquios um outro ciclo ascendente pode desenvolver-se. Para evitar isso, a eliminação ou a destruição deve ser apoiada por uma preparação isopática adequada.

Indicações

Promoção da simbiose na deficiência da flora intestinal e destruição da mucosa (membranas mucosas), gastrite, enterite, colite síndrome com colecistite e pancreatite com as seguintes queixas: diarreia, obstipação, vômito, úlcera péptica, micoses intestinais, vaginais e dérmicas.

Posologia e modo de administração

Salvo indicação médica em contrário:

• Adultos e adolescentes com mais de 12 anos:

1 a 3 comprimidos por dia, ingeridos com um pouco de água, antes das refeições ou ao deitar.

• Crianças com menos de 12 anos:

A dose depende do critério do médico ou profissional de saúde.

Não deve ser excedida a dose diária recomendada para adultos.

Contraindicações

No caso de hipersensibilidade ao *Penicillium roquefortii* e, como precaução, esta preparação não deve ser administrada

Reações adversas

Não são conhecidas, mas devido aos componentes orgânicos específicos de Fortakehl, pode ocorrer hipersensibilidade, neste caso descontinuar o tratamento, e tratar as reações sintomaticamente.

Interações medicamentosas

Não são conhecidas.

Efeitos secundários

Não são conhecidos.

Fertilidade, gravidez e lactação

Não há experiência de utilização deste medicamento homeopático durante a gravidez ou a lactação, pelo que não deve ser utilizado durante estes períodos, salvo indicação médica prévia.

Precauções

Verificar se a embalagem se encontra devidamente selada antes de utilizar.

Não utilizar fora do prazo indicado na embalagem.

Conservar ao abrigo da luz e a temperatura inferior a 25°C.

O produto deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Duração do tratamento

Depende do conselho do terapeuta.

Aviso

Este princípio activo está presente no Exmykehl.