

# FORTAKEHL® D5 Gotas

AIM n.º 0617475

## Apresentação

Frasco conta-gotas de 10 ml

## Composição/1 ml:

1 ml de *Penicillium roquefortii* e *volumine cellulae* (*Lyophil., steril.*) D5

Excipiente(s): Água purificada.



## Características

Fortakehl é obtido a partir da levedura do fungo *Penicillium roquefortii*, não é um antibiótico e não produz substâncias antibióticas. Portanto, não há ocorrência de efeitos secundários que podem aparecer durante um tratamento antibiótico, tais como alergias, deficiências hepáticas, destruição da flora intestinal, e da formação de cadeias resistentes à penicilina. Fortakehl é dado no início de todos os tratamentos de simbiose para a recuperação intestinal e, consecutivamente, para todas as outras micoses, tais como micoses vaginais, da pele e da boca. De acordo com Enderlein, o sangue de todos os seres humanos e mamíferos contém um endobionte de origem vegetal. A sua forma mais primitiva é a fase coloidal apatogénica, caracterizada por pequeníssimas partículas proteicas do tamanho de um vírus (0,01 µm). Um ciclo de desenvolvimento das formas primitivas, através da fase de bactéria, até à fase fúngica, é iniciada por factores endógenos ou exógenos, e a virulência do parasita aumenta com o crescente desenvolvimento da fase. Não existe ser humano que não tenha adquirido este endobionte através da placenta e que não seja hospedeiro das formas mais primitivas, nas suas células e fluidos corporais. Num corpo saudável, estas formas primitivas servem como reguladores, pois são capazes de copular ciclo geneticamente com formas parasitárias mais evoluídas, e reverte-las à sua forma primitiva. O corpo deve, em seguida, eliminar estes resíduos do seu corpo. Quando não é possível uma completa eliminação, através da pele, intestinos, rins e brônquios um outro ciclo ascendente pode desenvolver-se. Para evitar isso, a eliminação ou a destruição deve ser apoiada por uma preparação isopática adequada.

## Indicações

Promoção da simbiose na deficiência da flora intestinal e destruição da mucosa (membranas mucosas), gastrite, enterite, colite síndrome com colecistite e pancreatite com as seguintes queixas: diarreia, obstipação, vômito, ulcera péptica, micoses intestinais, vaginais e dérmicas.

## Posologia e Modo de Administração

Salvo indicação médica em contrário:

### • Adultos e Adolescentes com mais de 12 anos:

Via Oral: 5 a 10 gotas, uma vez ao dia.

### • Crianças com menos de 12 anos:

Via Oral: a dose recomendada é de uma gota por cada ano de vida (ex: 2 anos - 2 gotas), uma vez ao dia.

Não deve ser excedida a dose diária recomendada para adultos.

## Contraindicações

No caso de hipersensibilidade ao *Penicillium roquefortii* e, como precaução, esta preparação não deve ser administrada

## Reações adversas

Não são conhecidas, mas devido aos componentes orgânicos específicos de Fortakehl, pode ocorrer hipersensibilidade, neste caso descontinuar o tratamento, e tratar as reações sintomaticamente.

## Interações medicamentosas

Não são conhecidas.

## Efeitos secundários

Não são conhecidos.

**Fertilidade, gravidez e lactação**

Não há experiência de utilização deste medicamento homeopático durante a gravidez ou a lactação, pelo que não deve ser utilizado durante estes períodos, salvo indicação médica prévia.

**Precauções**

Verificar se a embalagem se encontra devidamente selada antes de utilizar.

Não utilizar fora do prazo indicado na embalagem.

Conservar ao abrigo da luz e a temperatura inferior a 25°C.

O produto deve ser mantido fora do alcance das crianças.

**Duração do tratamento**

Depende do conselho do terapeuta.

**Aviso**

Este princípio activo está presente no Exmykehl.