

MUCOKEHL® D3 POMADA

AIM n.º 0617590

Apresentação

Tubo de 30 g.

Composição/1g de pomada

100 mg de *Mucor racemosus* e *volumine cellulae* D3
Excipiente(s): 0,38 g de Lanolina (lanolina alcohols oitment),
0,23 g de propylene glycol, 0,13 g de água, 0,10 g de
Coconuroil fract., 0,03 g de Glyceryl monostearate
40 - 55, 0,02 g de magnesium sulphate a
Heptahydrate, 0,01 g de lactic acid.

Características

No sangue e tecidos de todos os seres humanos e animais, vivem micróbios que são inofensivos e que normalmente mantêm diversos mecanismos de regulação. Segundo o Prof. Enderlein, esses "Endobiontes" são geralmente não patogênicos nas suas fases fúngicas, como é o caso do *Mucor racemosus* Fresen. Como qualquer micróbio, está sujeito à lei da ciclogenia, o que significa que, se ocorrer o seu desenvolvimento através das seguintes fases: fase primitiva - bactéria - fungo, a virulência e patogenicidade do endobionte aumentam. Se introduzirmos num organismo doente no qual o estado de desenvolvimento do endobionte é superior, determinadas formas de valências inferiores, estas são capazes de degradar o endobionte para a fase primitiva e apatogénica. Estas podem então ser eliminadas através das vias urinárias, intestinos, pele e brônquios.

Indicações

Para os problemas venosos e distúrbios circulatórios, tais como úlcera varicosa, tromboflebites, hemorroidal, doença inflamatória generalizada, edemas, contusões, distensões, pubalgia, cicatrização quelóide, dermatite crónica.

Posologia e Modo de Administração

Salvo indicação médica em contrário:

• Adultos e adolescentes com mais de 12 anos:

Aplicar uma fina camada na área afetada 1 a 3 vezes por dia.

• Crianças com menos de 12 anos:

O mesmo modo de administração, dependendo a dose do critério do médico ou profissional de saúde.

Contraindicações

No caso de hipersensibilidade a *Mucor racemosus* e como precaução, esta preparação não deve ser administrada

Reações adversas

Não são conhecidas mas, devido aos componentes orgânicos específicos de Mucokehl, pode ocorrer hipersensibilidade. Neste caso descontinuar o tratamento e tratar as reações sintomaticamente.

Interações medicamentosas

Não administrar simultaneamente com Notakehl.

Efeitos secundários

Não são conhecidos.

Fertilidade, gravidez e lactação

Não há experiência de utilização deste medicamento homeopático durante a gravidez ou a lactação, pelo que não deve ser utilizado durante estes períodos, salvo indicação médica prévia.

Precauções

Verificar se a embalagem se encontra devidamente selada antes de utilizar.

Não utilizar fora do prazo indicado na embalagem.

Conservar ao abrigo da luz e a temperatura inferior a 25°C.

O produto deve ser mantido fora do alcance e da vista das crianças.

Duração do tratamento

Depende do conselho do terapeuta.

