

MUCOKEHL® D4 Cápsulas

AIM n.º 0617607

Apresentação:

Embalagem de 20 cápsulas

Composição/Cápsula:

330 mg de *Mucor racemosus e volumine cellulae* (Lyophil., steril.) D4.

Excipiente(s): monohidrato de lactose e, na concha das cápsulas, hypromellose.



Características:

No sangue e tecidos de todos os seres humanos e animais, vivem micróbios que são inofensivos e que normalmente mantêm diversos mecanismos de regulação. Segundo o Prof. Enderlein, esses "Endobiontes" são geralmente não patogênicos nas suas fases fúngicas, como é o caso do *Mucor racemosus Fresen.* Como qualquer micróbio, está sujeito à lei da ciclogenia, o que significa que, se o seu desenvolvimento através das seguintes fases: fase primitiva - bactéria - fungo, com este desenvolvimento a virulência e patogenicidade do endobionte aumenta. Se introduzirmos num organismo doente no qual o estado de desenvolvimento do endobionte é superior, determinadas formas de valências inferiores estes são capazes de degradar o endobionte para a fase primitiva e apatogénica. Estas podem então ser eliminadas através das vias urinárias, intestinos, pele e brônquios.

Indicações:

Para problemas agudos e crónicos do sistema vascular, tal como trombozes, embolismo, estado pós-enfarte, *angina pectoris*, distúrbios circulatórios, problemas de cicatrização, tais como úlcera varicosa, pé diabético, doença venosa, tal como a viscosidade sanguínea, hemorróidas, glaucoma, cataratas, e como medicamento base da terapia de simbiose.

Posologia e modo de administração:

Salvo indicação médica em contrário:

• Adultos e adolescentes com mais de 12 anos:

1 a 3 cápsulas por dia, ingeridas com um pouco de água, antes das refeições ou ao deitar.

Contraindicações:

No caso de hipersensibilidade à *Mucor racemosus* e como precaução, esta preparação não deve ser administrada

Reações adversas:

Não são conhecidas, mas devido aos componentes orgânicos específicos de Mucokehl, pode ocorrer hipersensibilidade. Neste caso descontinuar o tratamento e tratar as reações sintomaticamente.

Interações medicamentosas:

Não administrar simultaneamente com Notakehl.

Efeitos secundários:

Não são conhecidos.

Nota: No início do tratamento com medicamentos homeopáticos é possível que a doença em tratamento se intensifique. Esta é uma reação normal também conhecida em homeopatia como "agravação inicial" e considerada não nociva.

Fertilidade, gravidez e lactação:

Não há experiência de utilização deste medicamento homeopático durante a gravidez ou a lactação, pelo que não deve ser utilizado durante estes períodos, salvo indicação médica prévia.

Precauções:

Verificar se a embalagem se encontra devidamente selada antes de utilizar.

Não utilizar fora do prazo indicado na embalagem.

Conservar ao abrigo da luz e a temperatura inferior a 25°C.

O produto deve ser mantido fora do alcance e da vista das crianças.

Duração do tratamento:

Depende do conselho do terapeuta.