

MUCOKEHL® D5 Gotas

AIM n.º 0617540



Apresentação

Frasco conta-gotas de 10 ml

Composição/1 ml

1 ml de *Mucor racemosus e volumine cellulae (Lyophil., steril.)* D5 dil.

Excipiente(s): Água purificada.

Características

No sangue e tecidos de todos os seres humanos e animais, vivem micróbios que são inofensivos e que normalmente mantêm diversos mecanismos de regulação. Segundo o Prof. Enderlein, esses "Endobiontes" são geralmente não patogênicos nas suas fases fúngicas, como é o caso do *Mucor racemosus Fresen.* Qualquer micróbio está sujeito à lei da ciclogenia, o que significa que o seu desenvolvimento passa pelas seguintes fases: fase primitiva - bactéria - fungo, deste modo a virulência e patogenicidade do endobionte aumenta. Se introduzirmos num organismo doente no qual o estado de desenvolvimento do endobionte é superior, determinadas formas de valências inferiores, estes são capazes de degradar o endobionte para a fase primitiva e apatogénica. Estas podem então ser eliminadas através das vias urinárias, intestinos, pele e brônquios.

Indicações

Para problemas agudos e crónicos do sistema vascular, tal como trombozes, embolismo, estado pós-enfarte, angina pectoris, distúrbios circulatórios, problemas de cicatrização, tais como úlcera varicosa, pé diabético, doença venosa, tal como a viscosidade sanguínea, hemorróidas, glaucoma, cataratas, como medicamento base da terapia de simbiose.

Posologia e Modo de Administração

Salvo indicação médica em contrário:

• Adultos e adolescentes com mais de 12 anos:

Via Oral: 5 a 10 gotas, uma vez ao dia.

Contraindicações

No caso de hipersensibilidade à *Mucor racemosus* e, como precaução, esta preparação não deve ser administrada

Reações adversas

Não são conhecidas, mas devido aos componentes orgânicos específicos de Mucokehl, pode ocorrer hipersensibilidade, neste caso descontinuar o tratamento, e tratar as reações sintomaticamente.

Interações medicamentosas

Não administrar simultaneamente com Notakehl.

Efeitos secundários

Não são conhecidos.

Fertilidade, gravidez e lactação

Não há experiência de utilização deste medicamento homeopático durante a gravidez ou a lactação, pelo que não deve ser utilizado durante estes períodos, salvo indicação médica prévia.

Precauções

Verificar se a embalagem se encontra devidamente selada antes de utilizar.

Não utilizar fora do prazo indicado na embalagem.

Conservar ao abrigo da luz e a temperatura inferior a 25°C.

O produto deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Duração do tratamento

Depende do conselho do terapeuta.