

NIGERSAN® D5 Comprimidos

AIM n.º 0617524



Apresentação:

Embalagem de 20 comprimidos

Composição/Comprimido:

250 mg de *Aspergillus niger e volumine cellulae (lyophil., steril.) D5*
Excipiente(s): Amido de batata, estearato de magnésio.

Características:

Nigersan® é um medicamento homeopático específico para o tratamento imunológico da paratuberculose e doenças secundárias associadas. Em contraste com os medicamentos químicos, bacteriostáticos e antibióticos, o Nigersan® não ataca o bacilo da tuberculose directamente. Em vez disso, e de acordo com a ciclogenia bacteriana, mencionada nos estudos do Prof. Enderlein, usa uma área mais fraca do ciclo de desenvolvimento do parasita, de forma a artificialmente acelerar um processo que em circunstâncias fisiológicas normais ocorre espontaneamente com a mudança das gerações e especialmente em todos os processos de cura. Com a terapia de Nigersan®, o bacilo da tuberculose regride da sua fase patogénica para a sua fase apatogénica, de forma a facilitar a sua eliminação através dos sistemas de excreção (intestinos, bexiga, pele e brônquios).

Indicações:

Para doenças do tracto urogenital, incluindo miomas uterinos; Quistos, Inflamações de origem tuberculínica, tais como, doença de Scheuermann, doença de Perthes e de Bechterew; osteocondrite, linfatismo, escrofulose, Obesidade.

Posologia e modo de administração:

Salvo indicação médica em contrário:

• Adultos e adolescentes com mais de 12 anos:

1 a 3 comprimidos por dia, ingeridos com um pouco de água.

Contraindicações:

No caso de hipersensibilidade à *Aspergillus niger* e, como precaução, esta preparação não deve ser administrada

Reações adversas:

Não são conhecidas, mas devido aos componentes orgânicos específicos de Nigersan, pode ocorrer hipersensibilidade, neste caso descontinuar o tratamento, e tratar as reações sintomaticamente.

Interações medicamentosas:

Não são conhecidas.

Efeitos secundários:

Não são conhecidos.

Nota: No início do tratamento com medicamentos homeopáticos é possível que a doença em tratamento se intensifique. Esta é uma reacção normal também conhecida em homeopatia como "agravação inicial" e considerada não nociva.

Fertilidade, gravidez e lactação:

Não há experiência de utilização deste medicamento homeopático durante a gravidez ou a lactação, pelo que não deve ser utilizado durante estes períodos, salvo indicação médica prévia.

Precauções:

Verificar se a embalagem se encontra devidamente selada antes de utilizar.

Não utilizar fora do prazo indicado na embalagem.

Conservar ao abrigo da luz e a temperatura inferior a 25°C.

O produto deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Duração do tratamento:

Depende do conselho do terapeuta.