

NIGERSAN® D5 Gotas

AIM n.º 0617566

Apresentação

Frasco conta-gotas de 10 ml

Composição/1 ml

1 ml de *Aspergillus niger e volumine cellulae*

(*lyophil., steril.*) D5

Excipiente(s): Água purificada.



Características

Nigersan® é uma preparação isopática específica para o tratamento imunobiológico da paratuberculose e doenças secundárias associadas. Em contraste com os medicamentos químicos, bacteriostáticos e antibióticos, o Nigersan® não ataca o bacilo da tuberculose directamente. Em vez disso - e de acordo com a ciclogénia da bactéria, retirada dos estudos do Prof. Enderlein - usa uma área mais fraca do ciclo de desenvolvimento do parasita, para artificialmente acelerar um processo que em circunstâncias fisiológicas normais ocorre espontaneamente com a mudança das gerações e especialmente em todos os processos de cura. Com a terapia de Nigersan®, o bacilo da tuberculose tem tendência a regredir da sua fase patogénica para a sua fase apatogénica, de forma a facilitar a sua eliminação através dos nossos sistemas de excreção (intestinos, bexiga, pele e brônquios).

Indicações

Para doenças do tracto urogenital, incluindo miomas uterinos; quistos, Inflamações de origem tuberculínica, tais como doença de Scheuermann, doença de Perthes e de Bechterew; osteocondrite, linfatismo, escrofulose, obesidade e verrugas.

Posologia e Modo de Administração

Salvo indicação médica em contrário:

• Adultos e adolescentes com mais de 12 anos:

Via Oral: 5 a 10 gotas, uma vez ao dia.

Não deve ser excedida a dose diária recomendada para adultos.

Contraindicações

No caso de hipersensibilidade à *Aspergillus niger* e como precaução, esta preparação não deve ser administrada.

Reações adversas

Não são conhecidas, mas devido aos componentes orgânicos específicos de Nigersan®, pode ocorrer hipersensibilidade. Neste caso descontinuar o tratamento e tratar as reações sintomaticamente.

Interações medicamentosas

Não são conhecidas.

Efeitos secundários

Não são conhecidos.

Fertilidade, gravidez e lactação

Não há experiência de utilização deste medicamento homeopático durante a gravidez ou a lactação, pelo que não deve ser utilizado durante estes períodos, salvo indicação médica prévia.

Precauções

Verificar se a embalagem se encontra devidamente selada antes de utilizar.

Não utilizar fora do prazo indicado na embalagem.

Conservar ao abrigo da luz e a temperatura inferior a 25°C.

O produto deve ser mantido fora do alcance e da vista das crianças.

Duração do tratamento

Depende do conselho do terapeuta.