

NOTAKEHL® D5 Comprimidos

AIM n.º 0617582



Apresentação

Embalagem de 20 comprimidos

Composição/Comprimido:

250 mg de *Penicillium chrysogenum* e *volumine cellulae* (lyophil., steril.) D5.
Excipiente(s): Amido de batata, estearato de magnésio, lactose.

Características

Notakehl® é obtido do fungo *Penicillium chrysogenum*; não é um antibiótico e não produz substâncias antibióticas. Portanto, não existem efeitos colaterais que podem ocorrer durante um tratamento com antibióticos, tais como alergias, problemas hepáticos, destruição da flora intestinal, e formação de microrganismos resistentes aos antibióticos. Notakehl® atua especificamente em todas as infeções causadas por *Streptococcus* e *Staphylococcus*. Em uma aplicação alternada de Mucokehl® ou Nigersan®, o Notakehl® desempenha um papel importante para a terapia estimulativa.

Indicações

Para supurações bacterianas condicionadas, tais como amigdalites, laringite; para supurações dentárias como tratamento pós extração; síndromes de afeções da coluna vertebral, síndrome lombar, otite, neurites, nevralgias, afeções do tracto urogenital, tais como adenoma de próstata, infeções do trato urinário, doenças pulmonares, como asma, bronquite, sinobronquite e acne.

Posologia e modo de administração

Salvo indicação médica em contrário:

Adultos e adolescentes com mais de 12 anos:

Via Oral: 1 comprimido, 1 a 3 vezes ao dia, ingeridos com um pouco de água, antes das refeições ou ao deitar.

Contraindicações

No caso de hipersensibilidade à *Penicillium chrysogenum* e como precaução, esta preparação não deve ser administrada.
Intolerância à lactose.

Reações adversas

Não são conhecidas, mas devido aos componentes orgânicos específicos de Notakehl®, pode ocorrer hipersensibilidade. Neste caso descontinuar o tratamento e tratar as reações sintomaticamente.

Interações medicamentosas

Não administrar simultaneamente com Mucokehl.

Efeitos secundários

Não são conhecidos.

Fertilidade, gravidez e lactação

Não há experiência de utilização deste medicamento homeopático durante a gravidez ou a lactação, pelo que não deve ser utilizado durante estes períodos, salvo indicação médica prévia.

Precauções

Verificar se a embalagem se encontra devidamente selada antes de utilizar.

Não utilizar fora do prazo indicado na embalagem.

Conservar ao abrigo da luz e a temperatura inferior a 25°C.

O produto deve ser mantido fora do alcance e da vista das crianças.

Duração do tratamento

Depende do conselho do terapeuta.