

PEFRAKEHL® D4 Cápsulas

AIM n.º 0617334

Apresentação

Embalagem de 20 cápsulas

Composição/Cápsula

330 mg de *Candida parapsilosis* e *volumine cellulae*

(*yophil, steril.*) D4 tri.

Excipiente(s): Monohidrato de Lactose e, na concha das cápsulas, hypromellose.

Características

O Pefrakehl® é um extrato de levedura *Candida parapsilosis*. De acordo com o princípio da terapia SANUM, esta preparação pode restaurar uma simbiose entre coabitantes de origem vegetal, tais como, o microrganismo que está na origem da candidíase e o seu hospedeiro. De acordo com Enderlein, neste processo as formas superiores de desenvolvimento de fungos patogénicos são tratadas com formas inferiores e estágios mais baixos do mesmo fungo. Os medicamentos homeopáticos podem causar reações, mas o tratamento não deve ser interrompido. Estas reações normalmente desaparecem após alguns dias e podem dar algumas informações sobre o tipo de doença e a possibilidade de tratamento completo.

Indicações

Para todas as micoses entéricas, especialmente *Candida* e doenças secundárias, como dermatomicoses, micoses genitais, todas as doenças virais e bacterianas da boca, como fissuras da comissura labial, aftas, pênfigo vulgar, granuloma dentário, para outros problemas como, linfadenite, cistite, otite externa gastroenterite e hepatocolonpatia.

Posologia e modo de administração

Salvo indicação médica em contrário:

• Adultos e Adolescentes com mais de 12 anos:

1 a 3 cápsulas por dia, ingeridas com um pouco de água, antes das refeições ou ao deitar.

• Crianças com menos de 12 anos:

A dose depende do critério do médico ou profissional de saúde.

Não deve ser excedida a dose diária recomendada para adultos.

Contraindicações

No caso de hipersensibilidade à *Candida parapsilosis* e, como precaução, esta preparação não deve ser administrada.

Reações adversas

Não são conhecidas, mas devido aos componentes orgânicos específicos de Pefrakehl®, pode ocorrer hipersensibilidade, neste caso descontinuar o tratamento, e tratar as reações sintomaticamente.

Interações medicamentosas

Não são conhecidas.

Efeitos secundários

Não são conhecidos.

Precauções

Tal como acontece com todos os medicamentos e, devido à variação dos estudos clínicos, aconselhamento profissional médico deve ser procurado antes de recomendar este produto a mulheres grávidas ou em fase de amamentação, e a crianças.

Verificar se a embalagem se encontra devidamente selada antes de utilizar.

Não utilizar fora do prazo indicado na embalagem.

Conservar ao abrigo da luz e a temperatura inferior a 25°C.

O produto deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Duração do tratamento

Depende do conselho do terapeuta.

