

# PEFRAKEHL® D3 Pomada

AIM n.º 0617342

## Apresentação

Tubo de 30 g.

## Ingredientes/1g de pomada:

100 mg de *Candida parapsilosis* e *volumine cellulae* D3  
Excipiente(s): 0,38 g de Lanolina (lanolina alcohols oitment),  
0,23 g de propylene glycol, 0,13 g de água, 0,10 g de  
Coconuroil fract., 0,03 g de Glyceryl monostearate  
40 - 55, 0,02 g de magnesium sulphate a Heptahydrate,  
0,01 g de lactic acid.

## Características

O Pefrakehl® é um extracto de levedura *Candida parapsilosis*. De acordo com o princípio da terapia SANUM, esta preparação pode restaurar uma simbiose entre coabitantes de origem vegetal, tais como, o microrganismo que está na origem da candidíase e o seu hospedeiro. De acordo com Enderlein, neste processo as formas superiores de desenvolvimento de fungos patogénicos são tratadas com formas inferiores e estágios mais baixos do mesmo fungo. Os medicamentos homeopáticos podem causar reações, mas o tratamento não deve ser interrompido. Estas reações normalmente desaparecem após alguns dias e podem dar algumas informações sobre o tipo de doença e a possibilidade de tratamento completo.

## Indicações

Para todas as micoses entéricas, especialmente *Candida* e doenças secundárias, como dermatomicoses, micoses genitais, todas as doenças virais e bacterianas da boca, como fissuras da comissura labial, aftas, pênfigo vulgar, granuloma dentário, para outros problemas como, linfadenite, cistite, otite externa gastroenterite e hepatocolonpatia.

## Posologia e modo de administração

Salvo indicação médica em contrário:

### Adultos e Crianças com mais de 12 anos:

Aplicar uma fina camada na área afetada 1 a 3 vezes por dia.

### Crianças com menos de 12 anos:

O mesmo modo de administração, dependendo a dose do critério do médico ou profissional de saúde.

## Contraindicações

No caso de hipersensibilidade à *Candida parapsilosis* e, como precaução, esta preparação não deve ser administrada.

## Reações adversas

Não são conhecidas, mas devido aos componentes orgânicos específicos de Pefrakehl®, pode ocorrer hipersensibilidade, neste caso descontinuar o tratamento, e tratar as reações sintomaticamente.

## Interações medicamentosas

Não são conhecidas.

## Efeitos secundários

Não são conhecidos.

## Precauções

Tal como acontece com todos os medicamentos e, devido à variação dos estudos clínicos, aconselhamento profissional médico deve ser procurado antes de recomendar este produto a mulheres grávidas ou em fase de amamentação, e a crianças.

Verificar se a embalagem se encontra devidamente selada antes de utilizar.

Não utilizar fora do prazo indicado na embalagem.

Conservar ao abrigo da luz e a temperatura inferior a 25°C.

O produto deve ser mantido fora do alcance das crianças.

## Duração do tratamento

Depende do conselho do terapeuta.

